

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

ARBO. VITI. RHONE-ALPES

ABONNEMENT ANNUEL: 90f

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A



Circonscription RHONE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

15 Octobre 1984

N° de série continue 288

Bulletin n° 20

ARBRES FRUITIERS

DEPERISSEMENT BACTERIEN DU PECHER

Nous sommes en début de chute des feuilles, et donc en période de traitements pour la protection des plaies foliaires. Le précédent Bulletin donne tous les détails utiles à ce sujet.

BACTERIOSE DU CERISIER

Dans les vergers atteints par cette affection (destruction des bourgeons, chancres sur les branches), les plaies foliaires sont également à protéger pendant toute la durée de la chute des feuilles à l'aide de 3 traitements cupriques à la dose de 200 g/hl de cuivre métal :

- le 1er dès réception
- le 2ème au tiers de la chute des feuilles
- le 3ème à la fin de la chute des feuilles

Sont particulièrement sensibles les jeunes vergers et les variétés suivantes : Napoléon, Marmotte, Hedelphingen, Reverchon, Van.

MALADIES DE CONSERVATION

La récolte n'est pas finie et les indications données dans notre Bulletin n° 18 du 3 septembre restent toujours valables.

TAVELURE ET MINEUSE MARBREE

Ces parasites peuvent être combattus actuellement par la destruction de leur forme de conservation sur feuilles, au moyen d'une application d'urée à la dose de 120 g de Perlurée à l'hectare. Faire suivre cette opération par un labour d'enfouissement qui accentuera l'efficacité de cette méthode.

FEU BACTERIEN

Cette grave maladie qui n'affecte que les pomoidées fruitières et ornementales (poires, pommes, aubépines, etc...) n'est pas signalée dans notre région. Cependant, quelques mesures peuvent en empêcher ou en retarder l'introduction :

- Surveiller les vergers et leur environnement, et nous prévenir en cas de symptômes douteux (jeunes pousses courbées ou noircies, chancres huileux sur tronc et branches). Tél. (7)862.20.30
- Désinfection des outils et matériel au moment de la cueillette
- Traitement préventif des vergers dès la récolte à l'aide de bouillie bordelaise à 250 g de cuivre métal à l'hl, et de leur environnement (cotoneaster, pyracantha, sorbier, aubépine) à 150 g/hl.

Les variétés les plus sensibles sont : Passe Crassane, Alexandrine D, Williams, Guyot (poires), Idared, Jonathan, Reine des Reinettes (pommes).